

# Teilnehmer für Studie „Tourette und Allergie“ gesucht

**Studie:** Tourette-Syndrom und Allergie

**Studienleiterin:** Dr. med. Elif Weidinger  
Ludwig-Maximilians-Universität München  
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie  
Nussbaumstraße 7  
80336 München  
Email: [Elif.Weidinger@med.uni-muenchen.de](mailto:Elif.Weidinger@med.uni-muenchen.de)

**Hintergrund:** Die Entstehung des Tourette-Syndroms ist ungeklärt. Neben einer genetischen Komponente gibt es auch Hinweise für Auffälligkeiten des Immunsystems bei einer Untergruppe von Tourette-Patienten. So sind beispielsweise vermehrte Infekte, die Tics nach sich ziehen und zum Teil auch unterhalten, bekannt. Entsprechend können bei einer Untergruppe von Patienten Antibiotika als Therapie der Tics eingesetzt werden. Inhalt jüngster Forschungsarbeiten ist die Untersuchung von Allergien bei Tourette-Patienten. Hierzu gibt es allerdings bisher nur wenige Daten.

**Ziel:** Ziel dieser Studie ist es, den Einfluss von allergischen Reaktionen auf die Symptomatik und Therapiemöglichkeiten des Tourette-Syndroms zu untersuchen.

**Ablauf:** Bei **50** Studienteilnehmern werden **zwei Studienvisiten, d.h. eine Aufnahme- und eine Nachuntersuchung nach drei Monaten, durchgeführt**. Im Rahmen der Aufnahmeuntersuchung werden Fragebögen bearbeitet, es wird Blut entnommen (23ml), ein Rachenabstrich vorgenommen und ein Röhrchen zum Einsenden einer Stuhlprobe mitgegeben. Der Zeitaufwand der Aufnahmeuntersuchung beträgt etwa 1.5 bis 2 Stunden. Die Nachuntersuchung wird dieselben Fragebögen, sowie eine erneute Blutentnahme (8ml) und einen Rachenabstrich umfassen. Die Ethikkommission hat die Durchführung der Studie zustimmend bewertet.

**Zeitraum:** Die Rekrutierung läuft von Juli 2014 **bis voraussichtlich August 2015**.

**Einschlusskriterien:**

- Tourette-Syndrom (ICD-10: F95.2)
- Vorstellung in der Tic-Ambulanz in München bei der Studienleiterin (Tic-Ambulanz immer dienstags)

**Ausschlusskriterien:**

- Im Vordergrund stehende psychiatrische Komorbidität
- Akute Suizidalität
- Schwangerschaft und Stillzeit
- Akuter oder chronischer Infekt im letzten Monat
- Einnahme entzündungshemmender Medikamente (ASS, Cortison, Ibuprofen, u.Ä.)

**Kontakt:** Bei Interesse bitte eine Email an: [Elif.Weidinger@med.uni-muenchen.de](mailto:Elif.Weidinger@med.uni-muenchen.de) zur Terminabsprache. Die Aufnahmeuntersuchung findet in der Regel **dienstags im Rahmen der Tic-Ambulanz** in München statt, für die Nachuntersuchung kann ein Termin von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 13 Uhr vereinbart werden.